

**Resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en la Población de Educación
Secundaria en Costa Rica. Año 2018
Diseño Muestral**

Año del último estudio (año de la recolección de la información): **Año 2018**

Población representada (Número de casos expandidos): **# Estudiantes 318,519**

La población estadística fue conformada por personas de 12 a 17 años estudiantes de secundaria

| | Población de estudiantes Representada | Muestra de la encuesta | Factor de Expansión (1) / (2) | |
|----------------|--|-------------------------------|--|---|
| Hombres | 158.788 | 3.484 | 46 | |
| Mujeres | 159.731 | 3.587 | 45 | |
| Total | 318519 | 7071 | 45 | |
| Niveles | Población de estudiantes Representada | Muestra de la encuesta | Factor de Expansión (1) / (2) | Edades dominantes (años) |
| 7° | 79.981 | 1.296 | 61,7 | 13 |
| 8° | 68.221 | 1.327 | 51,4 | 14 |
| 9° | 58.308 | 1.328 | 43,9 | 15 |
| 10° | 55.319 | 1.338 | 41,3 | 16 |
| 11° | 43.947 | 1.323 | 33,2 | 17 |
| 12° | 12.743 | 459 | 27,8 | 18 |
| TOTAL | 318.519 | 7.071 | 45,0 | nd |

Fuente: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) - nd: no hay dato

**Resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en la Población de Educación Secundaria en Costa Rica.
Año 2018**

**Prevalencias por sexo y totales
(Porcentajes)**

| Sustancia | Alguna vez en la Vida | | | Último año | | | Último mes | | |
|---|-----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | Hombres | Mujeres | Totales | Hombres | Mujeres | Totales | Hombres | Mujeres | Totales |
| Alcohol | 68,9% | 70,9% | 69,9% | 41,7% | 46,5% | 44,1% | 26,9% | 27,1% | 27,0% |
| Tabaco | 14,2% | 9,0% | 11,5% | 5,8% | 3,6% | 4,7% | 3,4% | 1,8% | 2,6% |
| Inhalables | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Sedantes sin prescripción | 4,6% | 5,1% | 4,9% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,1% | 2,9% | 3,0% |
| Estimulantes sin prescripción | 6,3% | 4,8% | 5,6% | 4,7% | 3,7% | 4,2% | 3,7% | 3,0% | 3,3% |
| Opioides sin prescripción | 6,9% | 10,3% | 8,6% | 6,3% | 9,3% | 7,8% | 5,2% | 7,3% | 6,3% |
| Marihuana | 11,9% | 7,0% | 9,4% | 6,5% | 3,8% | 5,1% | 4,1% | 1,9% | 3,0% |
| Hachís | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Cocaína (Clorhidrato) | 2,4% | 1,3% | 1,8% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 0,5% |
| Cocaína ¹ (Pasta base/Paco/Basuco) | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Crack | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 0,2% |
| Anfetaminas | n. d. | n. d. | 0,9% | n. d. | n. d. | 0,5% | n. d. | n. d. | 0,4% |
| Metanfetaminas | n. d. | n. d. | 0,9% | n. d. | n. d. | 0,5% | n. d. | n. d. | 0,3% |
| Éxtasis | n. d. | n. d. | 1,0% | n. d. | n. d. | 0,6% | n. d. | n. d. | 0,3% |
| Heroína | n. d. | n. d. | 0,7% | n. d. | n. d. | 0,4% | n. d. | n. d. | 0,3% |
| Plantas alucinógenas | n. d. | n. d. | 1,8% | n. d. | n. d. | 0,7% | n. d. | n. d. | 0,0% |
| Opio | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| LSD | n. d. | n. d. | 2,0% | n. d. | n. d. | 1,0% | n. d. | n. d. | 1,0% |
| GHB | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Ketamina | n. d. | n. d. | 0,8% | n. d. | n. d. | 0,4% | n. d. | n. d. | 27,0% |
| Hongos alucinógenos | n. d. | n. d. | 2,3% | n. d. | n. d. | 0,9% | n. d. | n. d. | 0,5% |

Fuente: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). n.d.: no hay dato

1: Esta presentación se conoce con esos nombres en otras latitudes del continente, no corresponde a lo que en el estudio se describe como basuco. Véase <https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/iafa-encuestanacional-adolescentes-2019EDITADO.pdf>

Resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en la Población de Educación Secundaria en Costa Rica. Año 2018
Prevalencia por grupo de edad o nivel educativo
(Porcentajes)

| Sustancia | Prevalencia de Vida | | | | | | Prevalencia del último AÑO | | | | | | Prevalencia del último MES | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | Grado 7 | Grado 8 | Grado 9 | Grado 10 | Grado 11 | Grado 12 | Grado 7 | Grado 8 | Grado 9 | Grado 10 | Grado 11 | Grado 12 | Grado 7 | Grado 8 | Grado 9 | Grado 10 | Grado 11 | Grado 12 |
| Alcohol | 56,20% | 68,10% | 79,30% | 81,90% | 84,10% | 93,9 | 27,90% | 41,80% | 52,80% | 57,80% | 64,60% | 77,9 | 16,30% | 23,60% | 30,30% | 36,60% | 47,10% | 58,70% |
| Tabaco | 6,50% | 10,60% | 13,20% | 15,50% | 20,30% | 22,8 | 2,70% | 4,40% | 5,50% | 6,10% | 7,80% | 9,9 | 1,70% | 1,80% | 3,10% | 3,00% | 5,30% | 4,30% |
| Inhalables | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Sedantes sin prescripción | 4,10% | 4,30% | 5,10% | 5,20% | 7,20% | 8,8 | 3,70% | 3,50% | 4,40% | 3,90% | 5,70% | 6,5 | 2,90% | 2,50% | 4,00% | 2,30% | 3,80% | 5,70% |
| Estimulantes sin prescripción | 5,50% | 4,90% | 4,60% | 6,10% | 7,10% | 10,8 | 4,30% | 3,50% | 4,00% | 4,10% | 5,30% | 7,8 | 3,50% | 3,00% | 3,30% | 3,10% | 3,50% | 6,40% |
| Opioides sin prescripción | 5,20% | 9,50% | 9,30% | 10,30% | 13,10% | 16 | 4,60% | 8,80% | 8,50% | 9,50% | 11,60% | 15 | 4,00% | 6,40% | 7,50% | 8,00% | 8,40% | 12,40% |
| Marihuana | 3,80% | 7,70% | 10,70% | 14,90% | 20,70% | 17,9 | 1,80% | 4,20% | 5,70% | 8,60% | 11,50% | 12,9 | 1,30% | 1,90% | 3,40% | 5,20% | 7,10% | 6,80% |
| Hachís | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cocaína (Clorhidrato) | 1,58% | 0,97% | 2,24% | 2,58% | 2,79% | 2,69 | 0,69% | 0,56% | 1,62% | 1,01% | 1,03% | 1,69 | 0,58% | 0,14% | 0,73% | 0,50% | 0,43% | 1,18% |
| Cocaína (Pasta base/Paco/Basuco) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Crack | 1,00% | 0,54% | 0,75% | 1,10% | 0,98% | 2,03 | 0,64% | 0,22% | 0,46% | 0,33% | 0,07% | 1,72 | 0,29% | 0,00% | 0,40% | 0,24% | 0,03% | 0,88% |
| Anfetaminas | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Metanfetaminas | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Éxtasis | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Heroína | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Morfina | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Opio | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LSD | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| GHB | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Ketamina | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Plantas/Hierbas alucinógenas | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

Fuente: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) ND: no hay dato

Resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en la Población de Educación Secundaria en Costa Rica.

Año 2018

**Percepción de gran riesgo a consumir frecuentemente sustancias
(Porcentajes)**

| Riesgo | Total |
|--|--------------|
| Fumar cigarrillos de tabaco de vez en cuando | 43,20% |
| Fumar cigarrillos de tabaco frecuentemente | 49,50% |
| Tomar bebidas alcohólicas de vez en cuando | 23,50% |
| Embriagarse con bebidas alcohólicas de vez en cuando | 41,00% |
| Tomar 5 o más bebidas alcohólicas por ocasión de vez en cuando | 43,70% |
| Tomar bebidas alcohólicas frecuentemente | 38,50% |
| Embriagarse con bebidas alcohólicas frecuentemente | 48,50% |
| Tomar 5 o más bebidas alcohólicas por ocasión frecuentemente | 49,70% |
| Tomar medicamentos sin prescripción médica de vez en cuando | 40,50% |
| Tomar medicamentos sin prescripción médica frecuentemente | 47,90% |
| Inhalar disolventes volátiles de vez en cuando | 40,00% |
| Inhalar disolventes volátiles frecuentemente | 47,30% |
| Fumar marihuana de vez en cuando | 43,60% |
| Fumar marihuana frecuentemente | 48,60% |
| Consumir cocaína de vez en cuando | 51,70% |
| Consumir cocaína frecuentemente | 54,20% |
| Consumir crack de vez en cuando | 51,80% |
| Consumir crack frecuentemente | 54,60% |
| Usar éxtasis de vez en cuando | 50,20% |
| Usar éxtasis frecuentemente | 53,60% |

Fuente: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).